



Capas descartáveis para
SERINGA TRÍPLICE MODELO DABI

Capas descartáveis para
SERINGA TRÍPLICE MODELO DABI




Capas descartáveis para
SERINGA TRÍPLICE MODELO DABI

Capas descartáveis para
SERINGA TRÍPLICE MODELO KAVO



Capas descartáveis para
SERINGA TRÍPLICE MODELO KAVO

Capas descartáveis para
SERINGA TRÍPLICE MODELO KAVO



SOLUÇÃO ANTISSEPTICA BUCAL
SEM ÁLCOOL

CLOREXGARD

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%

AUXILIA A COMBATER OS GERMES CAUSADORES DA:

GENGIVITE PLACA BACTERIANA MUCOSITE MAU HÁLITO

SABOR MENTA

ANTISSEPSIA PROFILÁTICA - PRÉ / PÓS-OPERATÓRIO E CLÍNICA

1L
(1000ml)

USEM ESTE PRODUTO SOMENTE SOB A ORIENTAÇÃO DO SEU DENTISTA OU MÉDICO. EVITAR A INGESTÃO.

Indicações: Atua como antisséptico altamente eficaz no controle da placa bacteriana, na prevenção das doenças gengivais com ação comprovadamente segura na eliminação dos germes que causam a gengivite e a progressão de doenças periodontais. Redução significativa do número de microorganismos gram positivos, gram negativos e alguns leveduras na placa e saliva após o uso, com redução de até 99% das bactérias e uma considerável redução das bactérias no spray da caneta. Apresenta um espectro de ação residual estimado em 8 horas.
Mecanismo de ação: O mecanismo de ação antimicrobiana do Digluconato de Clorexidina relaciona-se à sua carga catiônica que se une às paredes celulares microbianas e a outros complexos, alterando o equilíbrio osmótico celular.
Contra-indicações / Precauções: Não deve ser indicado ou usado para pessoas com hipersensibilidade ou reação alérgica ao Digluconato de Clorexidina. Não se estabeleceu a eficácia clínica e segurança do produto em crianças e mulheres grávidas, além disso, não se sabe se o Digluconato de Clorexidina afeta a lactação. Por isso, deve ser utilizado com precaução se o paciente estiver Grávida, Lactante ou em Crianças menores de 4 anos.
**Condições clínicas experimentais indicam que o uso prolongado de uma solução bucal de Digluconato de Clorexidina pode causar parte da paladar; manchar os dentes e restaurações que, na maioria das vezes, retornam após a interrupção do uso do produto. Ainda, aumentar os depósitos de cálculo supragengival, os quais devem ser removidos através de técnicas rotineiras. Usar somente para bochechos. Não engolir. Conservação: Conservar em temperatura ambiente (15-30°C).
Composição: CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, GLYCERIN, POLYOXYETHYLENE-20, SODIUM SACCHARIN, SALICIL. ACQUA.**

PERLARD PHARMACOS LTDA. IND. BRASILEIRA CNPJ: 06.110.475/0001-54 - AV. DOM PEDRO I, 1300 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP - CEP: 04.300-000 - RASP. TÉCNICO. DIRETO A VICENTINE - CAU - 00202793
REG. ANVISA Nº 7.844.715-4 ANVISA Nº DO PROCESSO 25351.832340/2018-81
PERLARDPHARMACOS@GMAIL.COM
VIG. 2 ANOS LOT. Nº

Trihydral